

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Έλεγξε την κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού κατά του τετάνου (βλ. Τέτανος)

Φόρεσε γάντια μίας χρήσης όταν πρόκειται να έρθεις σε επαφή με αίμα ή άλλες εκκρίσεις του σώματος

Συνυπάρχει ακρωτηριασμός;

ΝΑΙ



ΚΑΛΕΣΕ το ΕΚΑΒ 166

ΟΧΙ

- Πίεσε την πληγή σταθερά με ένα καθαρό πανί για να σταματήσει η αιμορραγία
- Ανασήκωσε το σημείο του σώματος απαλά.
- Αν υποψιάζεσαι κάταγμα, υποστήριξε προσεκτικά το τμήμα και σήκωσε στη συνέχεια.
- Εφάρμοσε περιδέση στην πληγή με τόση πίεση ώστε να μην σταματήσει η κυκλοφορία του αίματος.
- Προσοχή: μην εφαρμόζεις σφιχτή περιδέση που σταματά την κυκλοφορία του αίματος.

- Τοποθέτησε το ακρωτηριασμένο τμήμα σε μία πλαστική σακούλα
- Δέσε σφιχτά την σακούλα.
- Βάλε την σακούλα μέσα σε πάγο.
- **Μην βάλεις το ακρωτηριασμένο μέλος σε άμεση επαφή με τον πάγο.**
- Μην ξεχάσεις να σταλεί η σακούλα στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί

Η αιμορραγία συνεχίζεται με μεγάλη ροή, χωρίς έλεγχο;

ΝΑΙ



ΚΑΛΕΣΕ το ΕΚΑΒ 166

ΟΧΙ

Αν το δέρμα παρουσιάζει κενό / χάσμα, ίσως χρειάζεται συρραφή.
Επικοινωνήσε με τον ιατρό του παιδιού για περαιτέρω οδηγίες.
ΧΡΗΣΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

- Τοποθέτησε το παιδί σε ύπτια θέση.
- Ανασήκωσε τα κάτω άκρα του κατά 20-25 εκατοστά, **εκτός** αν αυτό του προξενεί πόνο ή ενόχληση ή αν υπάρχει υποψία κάκωσης του αυχένα ή της ράχης.
- Κράτησε τη θερμοκρασία του σώματός του φυσιολογική.
- Σκέπασε το παιδί με κουβέρτα ή σεντόνι.

ΚΑΛΕΣΕ το ΕΚΑΒ 166
Επικοινωνήσε με τον ιατρό του παιδιού για άμεσες οδηγίες.